

■ [공통: 수학 I·수학 II]

01. ⑤ 02. ④ 03. ⑤ 04. ② 05. ④
06. ⑤ 07. ③ 08. ① 09. ④ 10. ③
11. ② 12. ① 13. ⑤ 14. ④ 15. ②
16. 7 17. 33 18. 96 19. 41
20. 36 21. 16 22. 64

1. 출제의도 : 지수법칙을 이용하여 식의 값을 구할 수 있는가?

풀이 :

$$\begin{aligned} \sqrt[3]{5} \times 25^{\frac{1}{3}} &= 5^{\frac{1}{3}} \times (5^2)^{\frac{1}{3}} \\ &= 5^{\frac{1}{3}} \times 5^{\frac{2}{3}} \\ &= 5^{\frac{1}{3} + \frac{2}{3}} \\ &= 5^1 = 5 \end{aligned}$$

정답 ⑤

2. 출제의도 : 미분계수를 구할 수 있는가?

풀이 :

$$\begin{aligned} f'(x) &= 3x^2 - 8 \text{이므로} \\ \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+h) - f(2)}{h} \\ &= f'(2) \\ &= 3 \times 2^2 - 8 \\ &= 4 \end{aligned}$$

정답 ④

3. 출제의도 : 등비수열의 일반항을 이용하여 양수 k 의 값을 구할 수 있는가?

풀이 :

등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항과 공비가 모두 양수 k 이므로

$$a_n = k^n$$

$$\frac{a_4}{a_2} + \frac{a_2}{a_1} = 30 \text{에서}$$

$$\frac{k^4}{k^2} + \frac{k^2}{k} = 30$$

$$k^2 + k = 30$$

$$k^2 + k - 30 = 0$$

$$(k+6)(k-5) = 0$$

$$k > 0 \text{이므로}$$

$$k = 5$$

정답 ⑤

4. 출제의도 : 함수의 연속의 정의를 이해하고 상수의 값을 구할 수 있는가?

풀이 :

함수 $f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이므로 $x = -2$ 에서 연속이어야 한다.

$$\text{즉, } \lim_{x \rightarrow -2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow -2^+} f(x) = f(-2) \text{에서}$$

$$\lim_{x \rightarrow -2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow -2^-} (5x + a) = -10 + a$$

$$\lim_{x \rightarrow -2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow -2^+} (x^2 - a) = 4 - a$$

$$f(-2) = 4 - a$$

이므로

$-10 + a = 4 - a$, $a = 7$
따라서 상수 a 의 값은 7이다.

정답 ②

5. 출제의도 : 함수의 곱의 미분법을 사용하여 미분계수를 구할 수 있는가?

풀이 :

$$f(x) = (x^2 + 1)(3x^2 - x) \text{에서}$$

$$f'(x) = 2x \times (3x^2 - x) + (x^2 + 1) \times (6x - 1)$$

따라서

$$f'(1) = 2 \times 2 + 2 \times 5 = 14$$

정답 ④

6. 출제의도 : 삼각함수의 성질을 이해하여 식의 값을 구할 수 있는가?

풀이 :

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) = -\frac{1}{5} \text{에서}$$

$$\sin \theta = \frac{1}{5}$$

따라서

$$\frac{\sin \theta}{1 - \cos^2 \theta} = \frac{\sin \theta}{\sin^2 \theta} = \frac{1}{\sin \theta} = \frac{1}{\frac{1}{5}} = 5$$

정답 ⑤

7. 출제의도 : 정적분으로 정의된 함수를 이해하고 함숫값을 구할 수 있는가?

풀이 :

$$\int_0^x f(t) dt = 3x^3 + 2x \text{의 양변을 } x \text{에 대해}$$

미분하면

$$f(x) = 9x^2 + 2$$

따라서

$$f(1) = 9 \times 1^2 + 2 = 11$$

정답 ③

8. 출제의도 : 로그의 정의와 성질을 이용하여 값을 간단히 나타낼 수 있는가?

풀이 :

$$a = 2 \log \frac{1}{\sqrt{10}} + \log_2 20$$

$$= 2 \times \left(-\frac{1}{2}\right) \log 10 + \log_2 2 + \log_2 10$$

$$= -1 + 1 + \log_2 10 = \log_2 10$$

$$a \times b = \log_2 10 \times \log 2 = 1$$

정답 ①

9. 출제의도 : 정적분의 정의와 성질을 이용하여 상수의 값을 구할 수 있는가?

풀이 :

$$\int_{-2}^a f(x)dx = \int_{-2}^0 f(x)dx + \int_0^a f(x)dx \dots\dots \textcircled{A}$$

ⓐ의 좌변은 정적분의 성질을 이용하여 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\int_{-2}^a f(x)dx = \int_{-2}^0 f(x)dx + \int_0^a f(x)dx$$

그러므로 ⓐ에서

$$\int_{-2}^0 f(x)dx + \int_0^a f(x)dx = \int_{-2}^0 f(x)dx$$

$$\text{즉, } \int_0^a f(x)dx = 0$$

이때

$$\begin{aligned} \int_0^a f(x)dx &= \int_0^a (3x^2 - 16x - 20)dx \\ &= \left[x^3 - 8x^2 - 20x \right]_0^a \\ &= a^3 - 8a^2 - 20a \end{aligned}$$

이므로

$$a^3 - 8a^2 - 20a = 0 \text{에서}$$

$$a(a^2 - 8a - 20) = 0$$

$$a(a+2)(a-10) = 0$$

따라서 양수 a 의 값은 10이다.

정답 ④

10. 출제의도 : 코사인함수의 최댓값과 주기를 구할 수 있는가?

풀이 :

함수 $f(x) = a\cos bx + 3$ 의 그래프는 함수 $y = a\cos bx$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 3만큼 평행이동시킨 것이다.

a 가 자연수이므로

$$f(0) \geq f(x)$$

이다.

한편, 함수 $y = a\cos bx + 3$ 의 주기는

$$\frac{2\pi}{b}$$

단한구간 $[0, 2\pi]$ 에서 정의된 함수 $f(x)$

가 $x = \frac{\pi}{3}$ 에서 최댓값 13을 가지므로

$$a + 3 = 13 \dots\dots \textcircled{B}$$

$$\frac{2\pi}{b} \leq \frac{\pi}{3} \dots\dots \textcircled{C}$$

이어야 한다.

ⓑ에서

$$a = 10$$

ⓒ에서

$$b \geq 6$$

따라서 $a+b$ 의 최솟값은 $b=6$ 일 때

$$10 + 6 = 16$$

정답 ③

11. 출제의도 : 속도와 가속도를 구할 수 있는가?

풀이 :

점 P의 시각 t 에서의 속도와 가속도를 각각 v , a 라 하면

$$v = x' = 3t^2 - 3t - 6$$

$$a = v' = 6t - 3$$

이때 출발한 후 점 P의 운동 방향이 바뀌는 시각은

$$v = 3t^2 - 3t - 6 = 3(t-2)(t+1) = 0$$

에서

$$t = 2$$

따라서 $t=2$ 에서 점 P의 운동 방향이 바뀌므로 구하는 가속도는

$$6 \times 2 - 3 = 9$$

정답 ②

12. 출제의도 : 시그마의 성질을 이용하여 여러 가지 수열의 합을 구할 수 있는가?

풀이 :

$$\sum_{k=1}^n \frac{a_k}{b_{k+1}} = \frac{1}{2}n^2 \quad \dots\dots\textcircled{1}$$

①에 $n=1$ 을 대입하면

$$\frac{a_1}{b_2} = \frac{1}{2}$$

$$a_1 = 2 \text{이므로 } b_2 = 4$$

등차수열 $\{b_n\}$ 에서 $b_1 = 2$, $b_2 = 4$ 이므로 $\{b_n\}$ 은 첫째항이 2, 공차가 2인 등차수열이다.

$$\text{즉, } b_n = 2n$$

한편, ①의 양변에 n 대신 $n-1$ 을 대입하면

$$\sum_{k=1}^{n-1} \frac{a_k}{b_{k+1}} = \frac{1}{2}(n-1)^2 \quad \dots\dots\textcircled{2}$$

①-②을 하면

$$\frac{a_n}{b_{n+1}} = \frac{1}{2}n^2 - \frac{1}{2}(n-1)^2 = n - \frac{1}{2}$$

$$b_{n+1} = 2(n+1) \text{이므로}$$

$$a_n = 2(n+1) \left(n - \frac{1}{2} \right)$$

$$= 2n^2 + n - 1 \quad (n \geq 2)$$

이 때, $a_1 = 2$ 이므로

$$a_n = 2n^2 + n - 1$$

따라서

$$\sum_{k=1}^5 a_k = \sum_{k=1}^5 (2k^2 + k - 1)$$

$$= 2 \times \frac{5 \times 6 \times 11}{6} + \frac{5 \times 6}{2} - 1 \times 5$$

$$= 120$$

정답 ①

13. 출제의도 : 정적분을 활용하여 두 곡선 사이의 넓이를 구할 수 있는가?

풀이 :

$f(x)$ 는 최고차항의 계수가 1인 삼차함수이고 $f(1) = f(2) = 0$ 이므로

$$f(x) = (x-1)(x-2)(x-k) \quad (k \text{는 상수})$$

로 놓을 수 있다.

이때,

$$f'(x) = (x-2)(x-k) + (x-1)(x-k) + (x-1)(x-2)$$

이고, $f'(0) = -7$ 이므로

$$2k + k + 2 = -7$$

즉, $k = -3$ 이므로

$$f(x) = (x-1)(x-2)(x+3)$$

이고, $f(3) = 12$ 이므로 점 P의 좌표는

$$P(3, 12)$$

따라서 직선 OP의 방정식은 $y = 4x$ 이므로

$$\begin{aligned}
B-A &= \int_0^3 \{4x - f(x)\} dx \\
&= \int_0^3 \{4x - (x^3 - 7x + 6)\} dx \\
&= \int_0^3 (-x^3 + 11x - 6) dx \\
&= \left[-\frac{1}{4}x^4 + \frac{11}{2}x^2 - 6x \right]_0^3 \\
&= -\frac{1}{4} \times 81 + \frac{11}{2} \times 9 - 6 \times 3 \\
&= \frac{45}{4}
\end{aligned}$$

정답 ⑤

[참고]

점 Q의 x좌표를 a라 하면

$$\begin{aligned}
B-A &= \int_a^3 \{4x - f(x)\} dx - \int_0^a \{f(x) - 4x\} dx \\
&= \int_a^3 \{4x - f(x)\} dx + \int_0^a \{4x - f(x)\} dx \\
&= \int_0^3 \{4x - f(x)\} dx
\end{aligned}$$

14. 출제의도 : 사인법칙과 코사인법칙을 이용하여 삼각형의 넓이의 최댓값을 구할 수 있는가?

풀이 :

원 O의 반지름의 길이를 r이라 하면

$$\overline{AD} = \overline{AE} = r$$

이고 $\overline{AD} : \overline{DB} = 3 : 2$ 이므로

$$\overline{BD} = \frac{2}{3}r$$

또한 $\overline{CE} = x$ 라 하면 삼각형 ADE와 삼각형 ABC의 넓이가 각각

$$\frac{1}{2} \times r \times r \times \sin A = \frac{1}{2} r^2 \sin A$$

$$\frac{1}{2} \times \frac{5}{3}r \times (r+x) \times \sin A = \frac{5}{6} r(r+x) \sin A$$

이고 삼각형 ADE와 삼각형 ABC의 넓이의 비가 9 : 35이므로

$$\frac{1}{2} r^2 \sin A : \frac{5}{6} r(r+x) \sin A = 9 : 35$$

$$3r + 3x = 7r, \quad x = \frac{4}{3}r$$

이때 삼각형 ABC에서 사인법칙에 의하여

$$\frac{\overline{BC}}{\sin A} = \frac{\overline{AB}}{\sin C}$$

이고

$$\overline{AB} = \frac{5}{3}r, \quad \sin A : \sin C = 8 : 5$$

이므로

$$\begin{aligned}
\overline{BC} &= \overline{AB} \times \frac{\sin A}{\sin C} \\
&= \frac{5}{3}r \times \frac{8}{5}
\end{aligned}$$

$$= \frac{8}{3}r$$

$\angle ACB = \theta$ 라 하면 삼각형 ABC에서
코사인법칙에 의하여

$$\cos\theta = \frac{\left(\frac{8}{3}r\right)^2 + \left(\frac{7}{3}r\right)^2 - \left(\frac{5}{3}r\right)^2}{2 \times \frac{8}{3}r \times \frac{7}{3}r}$$

$$= \frac{11}{14}$$

이므로


$$\begin{aligned} \sin\theta &= \sqrt{1 - \cos^2\theta} \\ &= \sqrt{1 - \left(\frac{11}{14}\right)^2} \\ &= \frac{5\sqrt{3}}{14} \end{aligned}$$

또한 삼각형 ABC의 외접원의 반지름의
길이가 7이므로

$$\frac{\overline{AB}}{\sin\theta} = 2 \times 7, \text{ 즉 } \frac{5}{3}r = 14 \text{ 에서}$$

$$\frac{5}{3}r = 14\sin\theta = 14 \times \frac{5\sqrt{3}}{14} = 5\sqrt{3}$$

$$r = 3\sqrt{3}$$



점 A에서 선분 BC에 내린 수선의 발을
H라 하면

$$\overline{AH} = \overline{AC}\sin\theta$$

$$= \frac{7}{3}r\sin\theta$$

$$= \frac{7}{3} \times 3\sqrt{3} \times \frac{5\sqrt{3}}{14}$$

$$= \frac{15}{2}$$

따라서 직선 AH와 원 O가 만나는 점
중 삼각형 ABC의 외부의 점을 Q라
하면, 삼각형 PBC의 넓이가 최대일
때는 점 P가 점 Q의 위치에 있을
때이다.

이때

$$\begin{aligned} \overline{QH} &= r + \overline{AH} \\ &= 3\sqrt{3} + \frac{15}{2} \end{aligned}$$

이므로 삼각형 PBC의 넓이의 최댓값은

$$\begin{aligned} &\frac{1}{2} \times \frac{8}{3} \times 3\sqrt{3} \times \left(3\sqrt{3} + \frac{15}{2}\right) \\ &= 36 + 30\sqrt{3} \end{aligned}$$

정답 ④

15. 출제의도 : 함수의 미분가능과 함수
의 극대, 극소 및 그래프를 이용하여 함
수를 구할 수 있는가?

풀이 :

$$g(0) = 7$$

$x < 0$ 일 때,

$$g'(x) = 3x^2 + 2ax + 15$$

이므로

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} g'(x) = 15$$

조건 (가)에서 함수 $g(x)$ 가 실수 전체의
집합에서 미분가능하므로

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 7$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = 15$$

이차함수 $f(x)$ 의 최고차항의 계수를

$p(p < 0)$ 라 하면

$$f(x) = px^2 + 15x + 7$$

$$f'(x) = 2px + 15$$

$f'(x) = 0$ 에서

$$2px + 15 = 0$$

$$x = -\frac{15}{2p}$$

이때, $p < 0$ 이므로

$$-\frac{15}{2p} > 0$$

조건 (나)에서

x 에 대한 방정식 $g'(x) \times g'(x-4) = 0$ 의 서로 다른 실근의 개수가 4이므로

함수 $g(x)$ 는 $x < 0$ 에서 극댓값과 극솟값을 가져야 한다.

즉, $x < 0$ 에서

방정식 $g'(x) = 0$ 은 서로 다른 두 실근

$$\alpha, \beta (\alpha < \beta < 0)$$

를 갖고,

$$\beta = \alpha + 4, \quad -\frac{15}{2p} = \beta + 4 \quad \dots \textcircled{1}$$

이어야 한다.

이차방정식 $3x^2 + 2ax + 15 = 0$ 의 서로 다

른 두 실근이 $\alpha, \alpha + 4$ 이므로

이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$\alpha + (\alpha + 4) = -\frac{2a}{3} \quad \dots \textcircled{2}$$

$$\alpha(\alpha + 4) = 5 \quad \dots \textcircled{3}$$

$\textcircled{2}$ 에서

$$\alpha^2 + 4\alpha - 5 = 0$$

$$(\alpha + 5)(\alpha - 1) = 0$$

$\alpha < 0$ 이므로

$$\alpha = -5$$

$\alpha = -5$ 를 $\textcircled{1}$ 에 대입하면

$$-5 + (-5 + 4) = -\frac{2a}{3}$$

$$a = 9$$

$\alpha = -5$ 를 $\textcircled{3}$ 에 대입하면

$$\beta = -5 + 4 = -1$$

$$-\frac{15}{2p} = -1 + 4$$

$$p = -\frac{5}{2}$$

따라서

$$g(-2) = (-2)^3 + 9 \times (-2)^2 + 15 \times (-2) + 7 = 5$$

$$g(2) = -\frac{5}{2} \times 2^2 + 15 \times 2 + 7 = 27$$

이므로

$$g(-2) + g(2) = 5 + 27 = 32$$

정답 ②

16. 출제의도 : 로그의 진수에 미지수를 포함한 방정식의 해를 구할 수 있는가?

풀이 :

로그의 진수의 조건에 의해

$$x - 3 > 0, \quad 3x - 5 > 0$$

$$\text{즉, } x > 3 \quad \dots \textcircled{1}$$

$$\log_2(x - 3) = \log_4(3x - 5) \quad \dots \textcircled{2}$$

이때

$$\log_2(x-3) = \log_{2^2}(x-3)^2 = \log_4(x-3)^2$$

이므로 ㉠에서

$$\log_4(x-3)^2 = \log_4(3x-5)$$

즉, $(x-3)^2 = 3x-5$ 에서

$$x^2 - 6x + 9 = 3x - 5$$

$$x^2 - 9x + 14 = 0$$

$$(x-2)(x-7) = 0$$

따라서 ㉠에 의해 $x = 7$

정답 7

$$= \sum_{n=1}^4 12 = 12 \times 4 = 48$$

$$\sum_{n=9}^{16} a_n = \sum_{n=9}^{12} (a_n + a_{n+4})$$

$$= \sum_{n=9}^{12} 12 = 12 \times 4 = 48$$

따라서

$$\sum_{n=1}^{16} a_n = \sum_{n=1}^4 (a_n + a_{n+4}) + \sum_{n=9}^{12} (a_n + a_{n+4})$$

$$= 48 + 48 = 96$$

정답 96

17. 출제의도 : 다항함수의 부정적분을 구할 수 있는가?

풀이 :

$$f(x) = \int f'(x) dx = \int (9x^2 + 4x) dx$$

$$= 3x^3 + 2x^2 + C \quad (\text{단, } C \text{는 적분상수})$$

이때 $f(1) = 6$ 이므로 $C = 1$

따라서 $f(x) = 3x^3 + 2x^2 + 1$ 이므로

$$f(2) = 24 + 8 + 1 = 33$$

정답 33

18. 출제의도 : 귀납적으로 정의된 수열을 이해하여 수열의 합을 구할 수 있는가?

풀이 :

$$a_n + a_{n+4} = 12 \text{이므로}$$

$$\sum_{n=1}^8 a_n = \sum_{n=1}^4 (a_n + a_{n+4})$$

19. 출제의도 : 삼차함수의 극댓값을 구할 수 있는가?

풀이 :

$$f(x) = 2x^3 - 3ax^2 - 12a^2x \text{에서}$$

$$f'(x) = 6x^2 - 6ax - 12a^2$$

$$= 6(x+a)(x-2a)$$

$$f'(x) = 0 \text{에서}$$

$$x = -a \text{ 또는 } x = 2a$$

$a > 0$ 이므로

함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	\cdots	$-a$	\cdots	$2a$	\cdots
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	\nearrow	극대	\searrow	극소	\nearrow

함수 $f(x)$ 는 $x = -a$ 에서 극댓값을 갖고, $x = 2a$ 에서 극솟값을 갖는다.

함수 $f(x)$ 의 극댓값이 $\frac{7}{27}$ 이고

$$f(-a) = -2a^3 - 3a^3 + 12a^3 = 7a^3$$

이므로

$$7a^3 = \frac{7}{27} \text{에서}$$

$$a^3 = \frac{1}{27}$$

$a > 0$ 이므로

$$a = \frac{1}{3}$$

따라서

$$f(x) = 2x^3 - x^2 - \frac{4}{3}x$$

이므로


$$f(3) = 54 - 9 - 4 = 41$$

정답 41

20. 출제의도 : 지수의 성질과 지수함수의 그래프를 이용하여 주어진 값을 구할 수 있는가?

풀이 :

곡선 $y = \left(\frac{1}{5}\right)^{x-3}$ 과 직선 $y = x$ 는 다음 그림과 같다.



$x > k$ 인 모든 실수 x 에 대하여 $f(f(x)) = 3x$ ㉠

곡선 $y = \left(\frac{1}{5}\right)^{x-3}$ 과 직선 $y = x$ 가 만나는

점의 x 좌표가 k 이므로

$$\left(\frac{1}{5}\right)^{k-3} = k$$

즉, $\left(\frac{1}{5}\right)^k \times \left(\frac{1}{5}\right)^{-3} = k$ 에서

$$k \times 5^k = 5^3$$

그러므로 구하는 값은 다음과 같다.

$$\begin{aligned} f\left(\frac{1}{k^3 \times 5^{3k}}\right) &= f\left(\left(\frac{1}{k \times 5^k}\right)^3\right) \\ &= f\left(\left(\frac{1}{5^3}\right)^3\right) \\ &= f\left(\frac{1}{5^9}\right) \end{aligned} \quad \dots \text{㉡}$$

한편,

$x > k$ 에서 $f(x) = \left(\frac{1}{5}\right)^{x-3}$ 이므로

k 보다 작은 임의의 두 양수

y_1, y_2 ($y_1 < y_2$)에 대하여

$$f(x_1) = \left(\frac{1}{5}\right)^{x_1-3} = y_1$$

$$f(x_2) = \left(\frac{1}{5}\right)^{x_2-3} = y_2$$

인 x_1, x_2 ($k < x_2 < x_1$)이 존재한다.

㉠에서

$$f(f(x_1)) = 3x_1, \quad f(f(x_2)) = 3x_2$$

이므로

$$f(f(x_1)) > f(f(x_2))$$

즉, $f(y_1) > f(y_2)$ 이므로 함수 $f(x)$ 는 $x < k$ 에서 감소한다.

$x > k$ 에서 $f(x) = \left(\frac{1}{5}\right)^{x-3}$ 이므로 함수

$f(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 감소한다.

그러므로 ㉡에서

$$f(\alpha) = \frac{1}{5^9}$$

인 실수 α ($\alpha > k$)가 존재한다.

이때

$$f(\alpha) = \left(\frac{1}{5}\right)^{\alpha-3} = \frac{1}{5^9}$$

에서

$$\alpha - 3 = 9, \text{ 즉 } \alpha = 12$$

따라서 ㉠에 의해 구하는 값은

$$\begin{aligned} f\left(\frac{1}{k^3 \times 5^{3k}}\right) &= f\left(\frac{1}{5^9}\right) \\ &= f(f(\alpha)) \\ &= 3\alpha \\ &= 3 \times 12 \\ &= 36 \end{aligned}$$

정답 36

21. 출제의도 : 함수의 극한에 대한 조건이 주어졌을 때 미정계수를 구할 수 있는가?

풀이 :

삼차방정식 $x^3 + ax^2 + bx + 4 = 0$ 은 적어도 하나의 실근을 가지므로 $f(\beta) = 0$ 인 실수 β 가 존재한다.

모든 실수 α 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow \alpha} \frac{f(2x+1)}{f(x)}$ 의

값이 존재하므로 $f(\beta) = 0$ 인 β 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow \beta} f(x) = 0 \text{이고, } \lim_{x \rightarrow \beta} f(2x+1) = 0$$

함수 $f(x)$ 는 연속이므로 $f(2\beta+1) = 0$

즉 $2\beta+1$ 은 방정식 $f(x) = 0$ 의 근이다.

마찬가지 방법으로 $2\beta+1$ 이 방정식

$f(x) = 0$ 의 근이면 $2(2\beta+1)+1 = 4\beta+3$

도 방정식 $f(x) = 0$ 근이고

$2(4\beta+3)+1 = 8\beta+7$ 도 방정식 $f(x) = 0$

의 근이다.

만약 $\beta \neq 2\beta+1$, 즉 $\beta \neq -1$ 이면

$\beta, 2\beta+1, 4\beta+3, 8\beta+7$ 가 방정식

$f(x) = 0$ 의 서로 다른 네 근이다.

그러므로 방정식 $f(x) = 0$ 는 $x = -1$ 만 실근으로 갖는다.

$f(-1) = 0$ 에서

$$f(-1) = -1 + a - b + 4 = 0$$

$$b = a + 3$$

$$f(x) = x^3 + ax^2 + (a+3)x + 4$$

$$= (x+1)\{x^2 + (a-1)x + 4\}$$

$f(x) \neq (x+1)^3$ 이므로

이차방정식 $x^2 + (a-1)x + 4 = 0$ 의 실근은 존재하지 않는다.

위의 이차방정식의 판별식을 D 라 할 때

$$D = (a-1)^2 - 16 < 0$$

$$a^2 - 2a - 15 < 0$$

$$(a+3)(a-5) < 0$$

$$-3 < a < 5$$

$$f(1) = a + b + 5 = a + (a+3) + 5 = 2a + 8$$

에서 $f(1)$ 의 최댓값은 $a = 4$ 일 때,

$$2 \times 4 + 8 = 16$$

정답 16

22. 출제의도 : 귀납적으로 정의된 수열을 이해하여 첫째항의 절댓값을 추론할 수 있는가?

풀이 :

조건 (나)에서 $|a_m| = |a_{m+2}|$ 를 만족시키

는 자연수 m 의 최솟값이 3이므로 다음

의 경우로 나누어 생각할 수 있다.

(i) $|a_3|$ 이 홀수인 경우

$a_4 = a_3 - 3$ 이고 짝수이다.

$$a_5 = \frac{1}{2}a_4 = \frac{1}{2}(a_3 - 3)$$

$$|a_3| = |a_5| \text{에서}$$

$$|a_3| = \left| \frac{1}{2}(a_3 - 3) \right|$$

$$a_3 = 1 \text{ 또는 } a_3 = -3$$

$a_3 = 1$ 이면 $a_4 = -2$ 이고 1은 홀수이므로

a_2 는 짝수이고 $a_2 = 2$ 이므로 $|a_2| = |a_4|$

가 되어 조건 (나)를 만족시키지 않는다.

$a_3 = -3$ 이면 $a_4 = -6$ 이고 $a_2 = -6$ 이므로

$|a_2| = |a_4|$ 가 되어 조건 (나)를 만족시키지 않는다.

(ii) $|a_3|$ 이 0 또는 짝수인 경우

a_3	a_4	a_5
a_3	$\frac{1}{2}a_3$	$\frac{1}{2}a_3 - 3$
		$\frac{1}{4}a_3$

$$|a_3| = \left| \frac{1}{4}a_3 \right| \text{에서 } a_3 = 0$$

$a_3 = 0$ 이면 3 이상의 모든 자연수 m 에 대하여 $a_m = 0$ 이고 a_2, a_1 은 다음과 같다.

a_3	a_2	a_1
0	3	6
	0	

$a_2 = 0$ 이면 $|a_2| = |a_4|$ 가 되어 조건 (나)를 만족시키지 않으므로, 이때의 조건을 만족시키는 a_1 의 값은 6이다.

$$\text{한편, } |a_3| = \left| \frac{1}{2}a_3 - 3 \right| \text{에서}$$

$$a_3 = 2 \text{ 또는 } a_3 = -6$$

$a_3 = 2$ 이면 $a_4 = 1$ 이고 a_2, a_1 은 다음과 같다.

a_3	a_2	a_1
2	5	10
	4	7
		8

이때 조건을 만족시키는 a_1 의 값은 10, 7, 8이다.

$a_3 = -6$ 이면 $a_4 = -3$ 이고 a_2, a_1 은 다음과 같다.

a_3	a_2	a_1
-6	-3	
	-12	-9
		-24

$a_2 = -3$ 이면 $|a_2| = |a_4|$ 가 되어 조건 (나)를 만족시키지 않으므로, 이때의 조건을 만족시키는 a_1 의 값은 -9, -24이다.

따라서 조건을 만족시키는 모든 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $|a_1|$ 의 값의 합은

$$6 + (10 + 7 + 8) + (9 + 24) = 64$$

정답 64

■ [선택: 확률과 통계]

23. ⑤ 24. ③ 25. ① 26. ③ 27. ③
28. ② 29. 25 30. 19

23. 출제의도 : 이항정리를 이용하여 다항식의 계수를 구할 수 있는가?

풀이 :

다항식 $(x^3 + 2)^5$ 의 전개식의 일반항은 ${}_5C_r \times 2^{5-r} \times (x^3)^r$ ($r=0, 1, 2, \dots, 5$)
 x^6 항은 $r=2$ 일 때이므로 x^6 의 계수는 ${}_5C_2 \times 2^{5-2} = 10 \times 8 = 80$

정답 ⑤

24. 출제의도 : 조건부확률과 확률의 덧셈정리를 이용하여 확률을 구할 수 있는가?

풀이 :

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = P(A) \text{ 이므로}$$

$$P(A \cap B) = P(A)P(B)$$

$$\text{이때 } P(A) = \frac{1}{2}, P(A \cap B) = \frac{1}{5} \text{ 이므로}$$

$$P(B) = \frac{2}{5}$$

따라서

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$= \frac{1}{2} + \frac{2}{5} - \frac{1}{5}$$

$$= \frac{7}{10}$$

정답 ③

25. 출제의도 : 모평균의 신뢰구간을 구할 수 있는가?

풀이 :

모평균 m 에 대한 신뢰도 95%의 신뢰구간이 $a \leq m \leq b$ 이므로

$$b - a = 2 \times 1.96 \times \frac{2}{\sqrt{256}}$$

$$= 2 \times 1.96 \times \frac{1}{8}$$

$$= 0.49$$

정답 ①

26. 출제의도 : 여사건의 확률을 이용하여 확률을 구할 수 있는가?

풀이 :

어느 학급의 학생 16명 중 과목 A를 선택한 학생이 9명이므로 16명 중에서 선택한 3명의 학생 모두 과목 A를 선택할 확률은

$$\frac{{}_9C_3}{{}_{16}C_3} = \frac{9 \times 8 \times 7}{3 \times 2 \times 1} \div \frac{16 \times 15 \times 14}{3 \times 2 \times 1} = \frac{3}{20}$$

따라서 16명 중에서 선택한 3명의 학생 중 적어도 한 명이 과목 B를 선택한 학

생일 확률은 여사건의 확률에 의해

$$1 - \frac{3}{20} = \frac{17}{20}$$

정답 ③

27. 출제의도 : 표본평균의 분포를 이해하고 상수의 값을 구할 수 있는가?

풀이 :

모집단의 확률변수를 X 라 하면

$$E(X) = \frac{1+3+5+7+9}{5} = 5$$

$$V(X) = \frac{(1-5)^2 + (3-5)^2 + (5-5)^2 + (7-5)^2 + (9-5)^2}{5} = 8$$

모집단에서 임의추출한 크기가 3인 표본의 표본평균 \bar{X} 의 분산은

$$V(\bar{X}) = \frac{V(X)}{3} = \frac{8}{3}$$

$V(a\bar{X}+6) = 24$ 에서

$$V(a\bar{X}+6) = a^2 V(\bar{X}) = \frac{8}{3} a^2$$

이므로

$$\frac{8}{3} a^2 = 24 \text{에서 } a^2 = 9$$

따라서 양수 a 의 값은 3이다.

정답 ③

28. 출제의도 : 중복조합을 이용하여 조건을 만족시키는 함수의 개수를 구할 수 있는가?

풀이 :

6의 약수는 1, 2, 3, 6이므로 조건 (가)에서

$$f(1) \times f(6) = 1 \text{ 또는 } f(1) \times f(6) = 2$$

$$f(1) \times f(6) = 3 \text{ 또는 } f(1) \times f(6) = 6$$

(i) $f(1) \times f(6) = 1$ 일 때

$$f(1) = f(6) = 1$$

따라서 조건 (나)에서

$$2 \leq f(2) \leq f(3) \leq f(4) \leq f(5) \leq 2$$

$$\text{즉, } f(2) = f(3) = f(4) = f(5) = 2$$

따라서 이 조건을 만족시키는 함수 f 의 개수는 1이다.

(ii) $f(1) \times f(6) = 2$ 일 때

$$f(1) \leq f(6) \text{ 이므로 } f(1) = 1, f(6) = 2$$

따라서 조건 (나)에서

$$2 \leq f(2) \leq f(3) \leq f(4) \leq f(5) \leq 4$$

이므로 $f(2), f(3), f(4), f(5)$ 의 값을 정하는 경우의 수는 2, 3, 4 중에서 중복을 허락하여 4개를 선택하는 중복조합의 수와 같으므로

$${}_3H_4 = {}_{3+4-1}C_4$$

$$= {}_6C_4$$

$$= {}_6C_2$$

$$= \frac{6 \times 5}{2 \times 1} = 15$$

따라서 이 조건을 만족시키는 함수 f 의 개수는 15이다.

(iii) $f(1) \times f(6) = 3$ 일 때

$$f(1) \leq f(6) \text{ 이므로 } f(1) = 1, f(6) = 3$$

따라서 조건 (나)에서

$$2 \leq f(2) \leq f(3) \leq f(4) \leq f(5) \leq 6$$

이므로 $f(2), f(3), f(4), f(5)$ 의 값을 정하는 경우의 수는 2, 3, 4, 5, 6 중에서 중복을 허락하여 4개를 선택하는 중복조합의 수와 같으므로

$$\begin{aligned} {}_5H_4 &= {}_{5+4-1}C_4 \\ &= {}_8C_4 \\ &= \frac{8 \times 7 \times 6 \times 5}{4 \times 3 \times 2 \times 1} \\ &= 70 \end{aligned}$$

따라서 이 조건을 만족시키는 함수 f 의 개수는 70이다.

(iv) $f(1) \times f(6) = 6$ 일 때

$f(1) \leq f(6)$ 이므로

$f(1) = 1, f(6) = 6$ 또는

$f(1) = 2, f(6) = 3$

① $f(1) = 1, f(6) = 6$ 일 때

조건 (나)에서

$$2 \leq f(2) \leq f(3) \leq f(4) \leq f(5) \leq 12$$

이므로 $f(2), f(3), f(4), f(5)$ 의 값을 정하는 경우의 수는 2, 3, 4, 5, 6 중에서 중복을 허락하여 4개를 선택하는 중복조합의 수와 같으므로

$$\begin{aligned} {}_5H_4 &= {}_{5+4-1}C_4 \\ &= {}_8C_4 \\ &= \frac{8 \times 7 \times 6 \times 5}{4 \times 3 \times 2 \times 1} \\ &= 70 \end{aligned}$$

② $f(1) = 2, f(6) = 3$ 일 때

조건 (나)에서

$$4 \leq f(2) \leq f(3) \leq f(4) \leq f(5) \leq 6$$

이므로 $f(2), f(3), f(4), f(5)$ 의 값을

정하는 경우의 수는 4, 5, 6 중에서 중복을 허락하여 4개를 선택하는 중복조합의 수와 같으므로

$$\begin{aligned} {}_3H_4 &= {}_{3+4-1}C_4 \\ &= {}_6C_4 \\ &= {}_6C_2 \\ &= \frac{6 \times 5}{2 \times 1} = 15 \end{aligned}$$

따라서 이 조건을 만족시키는 함수 f 의 개수는 $70 + 15 = 85$ 이다.

(i), (ii), (iii), (iv)에 의하여 구하는 함수 f 의 개수는

$$1 + 15 + 70 + 85 = 171$$

정답 ②

29. 출제의도 : 정규분포 곡선의 특징을 이용하여 확률을 구할 수 있는가?

풀이 :

$$P(X \leq x) = P\left(Z \leq \frac{x - m_1}{\sigma_1}\right)$$

$$P(X \geq 40 - x) = P\left(Z \geq \frac{(40 - x) - m_1}{\sigma_1}\right)$$

이므로

$$P\left(Z \leq \frac{x - m_1}{\sigma_1}\right) = P\left(Z \geq \frac{(40 - x) - m_1}{\sigma_1}\right)$$

에서

$$\frac{x - m_1}{\sigma_1} + \frac{(40 - x) - m_1}{\sigma_1} = 0$$

$$40 - 2m_1 = 0, \quad m_1 = 20$$

또한

$$P(Y \leq x) = P\left(Z \leq \frac{x - m_2}{\sigma_2}\right)$$

$$\begin{aligned} P(X \leq x + 10) &= P\left(Z \leq \frac{(x + 10) - m_1}{\sigma_1}\right) \\ &= P\left(Z \leq \frac{x - 10}{\sigma_1}\right) \end{aligned}$$

이므로

$$P\left(Z \leq \frac{x - m_2}{\sigma_2}\right) = P\left(Z \leq \frac{x - 10}{\sigma_1}\right)$$

에서

$$\frac{x - m_2}{\sigma_2} = \frac{x - 10}{\sigma_1}$$

$$\sigma_1 x - m_2 \sigma_1 = \sigma_2 x - 10 \sigma_2$$

이 식은 x 에 대한 항등식이므로

$$\sigma_1 = \sigma_2, \quad -m_2 \sigma_1 = -10 \sigma_2$$

$$\text{즉 } m_2 = 10$$

$$P(15 \leq X \leq 20) + P(15 \leq Y \leq 20)$$

$$\begin{aligned} &= P\left(\frac{15 - 20}{\sigma_1} \leq Z \leq \frac{20 - 20}{\sigma_1}\right) \\ &\quad + P\left(\frac{15 - 10}{\sigma_2} \leq Z \leq \frac{20 - 10}{\sigma_2}\right) \end{aligned}$$

$$= P\left(-\frac{5}{\sigma_1} \leq Z \leq 0\right) + P\left(\frac{5}{\sigma_2} \leq Z \leq \frac{10}{\sigma_2}\right)$$

$$= P\left(0 \leq Z \leq \frac{5}{\sigma_1}\right) + P\left(\frac{5}{\sigma_2} \leq Z \leq \frac{10}{\sigma_2}\right)$$

$$= P\left(0 \leq Z \leq \frac{5}{\sigma_1}\right) + P\left(\frac{5}{\sigma_1} \leq Z \leq \frac{10}{\sigma_1}\right)$$

$$= P\left(0 \leq Z \leq \frac{10}{\sigma_1}\right) = 0.4772$$

이때 $P(0 \leq Z \leq 2) = 0.4772$ 이므로

$$\frac{10}{\sigma_1} = 2, \quad \sigma_1 = 5$$

$$\text{즉 } \sigma_2 = 5 \text{ 이므로}$$

$$m_1 + \sigma_2 = 20 + 5 = 25$$

30. 출제의도 : 사건의 독립을 이용하여 주어진 확률을 구할 수 있는가?

풀이 :

동전의 앞면을 H, 동전의 뒷면을 T라 하자. 6의 눈이 나올 때 동전의 앞면의 개수와 뒷면의 개수가 서로 바뀌므로 주어진 시행을 3번 반복했을 때, 6의 눈이 나온 횟수를 기준으로 경우를 나누어 5개의 동전이 모두 앞면이 보이도록 놓여 있을 확률을 구하면 다음과 같다.

(i) 6의 눈이 세 번 나온 경우

각 자리에 있는 동전이 TTHHH이므로 주어진 상황을 만족시키지 않는다.

(ii) 6의 눈이 두 번 나온 경우

3번의 시행 이후, 가능한 경우는 H가 1개, T가 4개 또는 H가 3개, T가 2개

이므로 주어진 상황을 만족시키지 않는다.

(iii) 6의 눈이 한 번 나온 경우

주어진 상황을 만족시키려면 1번째 자리, 2번째 자리의 동전을 각각 한 번씩 뒤집고, 5개의 동전을 한 번씩 뒤집어야 한다. 즉, 주사위의 눈의 수 1, 2, 6이 각각 한 번씩 나와야 한다.

이를 만족하는 경우의 수는 1, 2, 6을 일렬로 나열하는 경우의 수와 같

으므로

$$3! = 6$$

그러므로 이 경우의 확률은

$$\left(\frac{1}{6} \times \frac{1}{6} \times \frac{1}{6}\right) \times 3! = \frac{1}{36}$$

- (iv) 6의 눈이 한 번도 나오지 않는 경우
주어진 상황을 만족시키려면 3번째
자리, 4번째 자리, 5번째 자리의 동
전을 각각 한 번씩 뒤집어야 한다.
즉, 주사위의 눈의 수 3, 4, 5가 각
각 한 번씩 나와야 한다.

이를 만족하는 경우의 수는 3, 4, 5
를 일렬로 나열하는 경우의 수와 같

으므로

$$3! = 6$$

그러므로 이 경우의 확률은

$$\left(\frac{1}{6} \times \frac{1}{6} \times \frac{1}{6}\right) \times 3! = \frac{1}{36}$$

- (i) ~ (iv)에 의해 구하는 확률은

$$\frac{1}{36} + \frac{1}{36} = \frac{1}{18}$$

따라서 $p = 18$, $q = 1$ 이므로

$$p + q = 19$$

정답 19